

112. — *Serinus flavivertex sassii* NEUMANN.

Serinus flavivertex sassii NEUMANN, Orn. Monatsber., XXX, p. 13, 1922, Kivu. — H. SCHOUTEDEN, I, p. 172.

Spécimen recueilli :

N° 186, ♀ adulte, Tshumba, 14.IV.1938. Longueur de l'aile 77 mm. et du culmen exposé 10 mm.

L'exemplaire fut opposé à des séries de femelles des formes *S. f. flavivertex* (BLANFORD) et *S. f. sassii* NEUMANN.

113. — *Poliospiza striolata kivuensis* SCHOUTEDEN.

Poliospiza striolata kivuensis SCHOUTEDEN, Rev. Zool. Bot. Afr., vol. XXX, p. 167, 1937, Kivu; H. SCHOUTEDEN, I, p. 170.

Spécimens recueillis :

N° 182, ♂ adulte en plumage assez défraîchi, Tshumba, 15.IV.1938.

N° 182 et 189, ♂♂ adultes en plumage assez défraîchi, Tshumba, 14.IV.1938. Longueur de l'aile 67 mm. et du culmen exposé 11 mm.

Familia EMBERIZIDAE.

114. — *Fringillaria tahapisi tahapisi* (SMITH).

Emberiza tahapisi A. SMITH, Rep. Exped. C. Afr., p. 48, 1836, Sud-Est du Transvaal.

Fringillaria tahapisi tahapisi (SMITH) : H. SCHOUTEDEN, I, p. 174.

Spécimens recueillis :

N° 79, ♂ adulte, Rwindi, 15.II.1938.

N° 80, ♀ adulte, Rwindi, 15.II.1938.

Ces deux exemplaires ont été comparés à des séries d'oiseaux étiquetés *F. t. tahapisi* (SMITH) et *F. t. goslingi* ALEXANDER.

LISTE SYSTÉMATIQUE

DES OISEAUX CONNUS DU PARC NATIONAL ALBERT

SECTEUR NORD :

VALLÉE DE LA SEMLIKI-CONTREFORTS OCCIDENTAUX
DU MASSIF DU RUWENZORI

Fam. PODICIPIDAE.

Poliiocephalus ruficollis capensis (SALVADORI). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.

Fam. PHALACROCORACIDAE.

1. — *Phalacrocorax africanus africanus* (GMELIN). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 4), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 215), de la Semliki (LIPPENS, p. 7) et de Bilati/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
2. — *Phalacrocorax carbo lugubris* RÜPPELL. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 215).

Fam. ANHINGIDAE.

3. — *Anhinga rufa rufa* (LACÉPÈDE et DAUDIN). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 4), de Beni-Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 410) et de la Semliki (LIPPENS, p. 8).

Fam. PELECANIDAE.

4. — *Pelecanus rufescens* GMELIN. — Cité de Kasindi (SCHOUTEDEN, IV, p. 215; LÖNNBERG, p. 4) et de l'embouchure de la Semliki (LIPPENS, p. 10).

Fam. ARDEIDAE.

5. — *Ardea melanocephala* VIGORS et CHILDREN. — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 9; SCHOUTEDEN, I, p. 16), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 225) et de la Bombe (coll. J. DE WILDE).
6. — *Ardea purpurea purpurea* LINNÉ. — Noté de Bilati/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
7. — *Ardea goliath* CRETZSCHMAR. — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 19) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 224).
8. — *Casmerodius albus melanorhynchus* (WAGLER). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 17) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 225).
9. — *Mesophoyx intermedius brachyrhynchus* (BREHM). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 226).
10. — *Egretta garzetta garzetta* (LINNÉ). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 17).

11. — *Bubulcus ibis* (LINNÉ). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 225; REICHENOW, II, p. 253).
12. — *Ardeola ralloides ralloides* (SCOPOLI). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 15) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 224).
13. — *Butorides striatus atricapillus* (AFZELIUS). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 9), de la Semliki (LIPPENS, p. 14), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 253 et d'Ishango (coll. J. DE WILDE).
14. — *Nycticorax nycticorax nycticorax* (LINNÉ). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 13).

Fam. SCOPIDAE.

15. — *Scopus umbretta bannermani* C. GRANT. — Signalé de Kasindi (SCHOUTEDEN, I, p. 19) et de la Semliki (LIPPENS, p. 21).

Fam. CICONIIDAE.

16. — *Dissoura episcopus microscelis* (GRAY). — Signalé de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 224).
17. — *Sphenorhynchus abdimiti* (LICHTENSTEIN). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 223).
18. — *Anastomus lamelligerus lamelligerus* TEMMINCK. — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 8), de la Semliki (LIPPENS, p. 25) et de Beni (LÖNNBERG, p. 8; SCHOUTEDEN, IV, p. 223).
19. — *Ephippiorhynchus senegalensis* (SHAW). — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 24).
20. — *Leptoptilus crumeniferus* (LESSON). — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 24) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 223).

Fam. PLEGADIDAE.

21. — *Hagedashia hagedash nilotica* NEUMANN. — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 26).
22. — *Platalea alba* SCOPOLI. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 223).

Fam. ANATIDAE.

- Nyroca erythrophthalma* (WIED). — Peut être attendu dans la région.
- Anas sparsa leucostigma* RÜPPELL. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
23. — *Anas undulata undulata* DUBOIS. — Signalé de la rive Nord du lac Édouard (SCHOUTEDEN, IV, p. 216).
24. — *Nettion crecca crecca* (LINNÉ). — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 34).
25. — *Nettion capense* (GMELIN). — Signalé du Nord du lac Édouard (CHAPIN, I, p. 501).
26. — *Nettion punctatum* (BURCHELL). — Signalé du Nord du lac Édouard (CHAPIN, I, p. 501).
27. — *Paecilonitta erythrorhyncha* (GMELIN). — Cité de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 216).
28. — *Querquedula querquedula* (LINNÉ). — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 33) et du Ruwenzori (HARTERT, *Vögel Paläarkt. Fauna*, II, p. 1318, 1929).
29. — *Sarkidiornis melanonotus* (PENNANT). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 5) et de la Semliki (LIPPENS, p. 38; CHAPIN, I, p. 511).
30. — *Alopochen aegyptiacus* (LINNÉ). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 37) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 217).

Fam. AEGYPTIDAE.

31. — *Pseudogyps africanus* (SALVADORI). — Signalé de la vallée de la Semliki (SHARPE, p. 107).
32. — *Trigonoceps occipitalis* (BURCHELL). — Signalé de la vallée de la Semliki (SHARPE, p. 107).
- Necrosyrtes monachus pileatus* (BURCHELL). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.

Fam. FALCONIDAE.

33. — *Falco cuvieri* A. SMITH. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 234) et de la Rugetsi (coll. J. DE WILDE).
34. — *Falco peregrinus perconfusus* COLLIN et HARTERT. — Noté de la Semliki (coll. HACKARS).
35. — *Cerchneis tinnunculus tinnunculus* (LINNÉ). — Cité du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 264).
36. — *Cerchneis tinnunculus rufescens* (SWAINSON). — Cité du Ruwenzori (GROTE, III, p. 66; CHAPIN, I, p. 644) et de la Semliki (coll. HACKARS).
37. — *Dissodectes ardostaceus* (BONNATERRE et VIEILLOT). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 234).
38. — *Tinnunculus ruficollis ruficollis* (SWAINSON). — Noté de la Semliki (coll. HACKARS).
- Ardeca cuculoides batesi* (SWANN). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
39. — *Milvus migrans tenebrosus* GRANT et M.-PRAED. — Signalé de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 233) et du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 441).
40. — *Elanus caeruleus caeruleus* (DEFONTAINES). — Signalé de Beni (LÖNNBERG, p. 14; SCHOUTEDEN, IV, p. 233), de la Semliki (coll. HACKARS) et de la Rugetsi (coll. J. DE WILDE).
- Machaerhamphus alcinus anderssoni* (GURNEY). — Peut être attendu dans la région.
41. — *Aquila wahlbergi* SUNDEVALL. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 232).
42. — *Polemaëtus bellicosus* (DAUDIN). — Signalé de Mutsora-Ruwenzori (coll. FRECHKOP, p. 11) et du Ruwenzori (CHAPIN, I, p. 569).
43. — *Lophæëtus occipitalis* (DAUDIN). — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 360; SCHOUTEDEN, IV, p. 232) et du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 442).
44. — *Dryotriorchis spectabilis batesi* SHARPE. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 232).
45. — *Circæëtus cinerascens* MÜLLER. — Signalé de Beni (CHAPIN, I, p. 589).
- Terathopus ecaudatus* (DAUDIN). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
46. — *Kaupifalco monogrammicus meridionalis* (HARTLAUB). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 235; SASSI, I, p. 360; LÖNNBERG, p. 13) et du Ruwenzori (CHAPIN, I, p. 607).
47. — *Cuncuma vocifer* (DAUDIN). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 14) et de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 233).
48. — *Gypohterax angolensis* (GMELIN). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 233).
49. — *Buteo buteo vulpinus* (GLOGER). — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 442).
50. — *Buteo oreophilus* HARTERT et NAUMANN. — Signalé du Ruwenzori (CHAPIN, I, p. 610).

51. — *Buteo rufofuscus uugur* (RÜPPELL). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 232) et du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 442).
52. — *Accipiter minullus intermedius* ERLANGER. — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 359), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 231) et de la Semliki (coll. HACKARS).
53. — *Accipiter rufiventris* SMITH. — Cité de Buliha/Wanzalabana (coll. J. DE WILDE).
54. — *Astur melanoleucus* (A. SMITH). — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 443).
55. — *Astur castaltinus* (BONAPARTE). — Signalé de Beni (LÖNNBERG, p. 13) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 231).
56. — *Astur tachiro sparsimfasciatus* REICHENOW. — Noté de Nyabukoko/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
57. — *Melierax gabar* (DAUDIN). — Signalé de Kasindi (SASSI, I, p. 359).
58. — *Urotiorchis macrourus batesi* SWANN. — Noté de la vallée de la Semliki (CHAPIN, I, p. 621).
59. — *Circus pygargus* (LINNÉ). — Signalé de Kasindi-Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 231).
60. — *Circus ranivorus aequatorialis* STRESEMANN. — Cité du Nord-Ouest du lac Edouard (CHAPIN, I, p. 603).
61. — *Gymnogenys typicus typicus* (A. SMITH). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 230) et de la Luhule/Bombe (coll. J. DE WILDE).

Fam. TURNICIDAE.

62. — *Turnix nana* (SUNDEVALL). — Signalé de Kasindi (GYLDENSTOLPE, p. 313; CHAPIN, I, p. 723) et de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 313).
63. — *Turnix sylvatica lepurana* (A. SMITH). — Noté de Kasindi (CHAPIN, I, p. 720).

Fam. PHASIANIDAE.

64. — *Francolinus nahani* DUBOIS. — Signalé de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 230).
65. — *Francolinus squamatus zappeyi* MEARN. — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 452).
66. — *Francolinus leuallanti kikuyuensis* OG.-GRANT. — Noté de Kasindi (CHAPIN, I, p. 701).
67. — *Francolinus nobilis chapini* GRANT et M.-PRAED. — Signalé du Ruwenzori (CHAPIN, I, p. 710).
68. — *Francolinus icterorhynchus dybowskii* OUSTALET. — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 452).
69. — *Pternistis cranchii nyanzae* CONOVER. — Signalé de Kasindi (REICHENOW, I, p. 257; SASSI, I, p. 348) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 229).
70. — *Phasidus niger* CASSIN. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, *Rev. Zool. Bot. Afr.*, vol. XXXIII, fasc. 4, p. (94), 1940).
71. — *Numida meleagris toruensis* NEUMANN. — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 12) et de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, I, p. 37; REICHENOW, II, p. 256).
72. — *Guttera edouardi sethsmithi* NEUMANN. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 228; SASSI, I, p. 348; REICHENOW, II, p. 257; OG.-GRANT, p. 453), de Mutwanga-Ruwenzori (coll. FRECHKOP, p. 14) et de la Semliki (coll. J. DE WILDE).
73. — *Guttera plumifera schubotzi* REICHENOW. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 229).

Fam. RALLIDAE.

74. — *Linnocorax flavirostra* (SWAINSON). — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 40) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 221).
75. — *Sarothrura pulchra centralis* NEUMANN. — Signalé de Beni (REICHENOW, II, p. 248).
76. — *Porphyryla alleni* (THOMSON). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 221).

Fam. OTIDIDAE.

77. — *Lissotis melanogaster melanogaster* (RÜPPELL). — Signalé de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, I, p. 42).

Fam. CHARADRIIDAE.

78. — *Charadrius hiaticula tundrae* (LOWE). — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 356).
79. — *Charadrius pecuarius* TEMMINCK. — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 46).
80. — *Charadrius tricolor tricolor* VIEILLIOT. — Noté de Kasindi (REICHENOW, II, p. 243).
81. — *Stephanibyx coronatus coronatus* (BODDAERT). — Cité de la Semliki (SCHOUTEDEN, I, p. 46).
82. — *Stephanibyx lugubris* (LESSON). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 49) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 218).
83. — *Hoplopterus spinosus* (LINNÉ). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 51) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 218).
84. — *Anomalophrys superciliosus* (REICHENOW). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 218; SASSI, I, p. 355).
85. — *Afribyx senegallus lateralis* (A. SMITH). — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 51) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 218).
86. — *Hemiparra crassirostris crassirostris* (HARTLAUB). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 52) et de Kasindi (REICHENOW, II, p. 243).

Fam. RECURVIROSTRIDAE.

87. — *Himantopus himantopus himantopus* (LINNÉ). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 53) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 219).

Fam. SCOLOPACIDAE.

88. — *Capella gallinago gallinago* (LINNÉ). — Noté de la Semliki (LIPPENS, p. 63) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 220).
89. — *Capella media* (LATHAM). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 62).
90. — *Capella nigripennis* (BONAPARTE). — Signalé de Mutsora (coll. J. DE WILDE).
91. — *Erolia testacea* (PALLAS). — Noté de la Semliki (LIPPENS, p. 55).
92. — *Erolia minuta* (LEISLER). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 54).
93. — *Philomachus pugnax pugnax* (LINNÉ). — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 56).
94. — *Actitis hypoleucos* (LINNÉ). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 57) et de Beni (SASSI, I, p. 357; SCHOUTEDEN, IV, p. 219).
95. — *Tringa ocropus* LINNÉ. — Noté de la Semliki (LIPPENS, p. 61) et de Bilati/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
96. — *Tringa stagnatilis* (BECHSTEIN). — Noté de la Semliki (LIPPENS, p. 59) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 219).

97. — *Tringa nebularia* (GUNNERUS). — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 58).
 98. — *Tringa glareola* LINNÉ. — Noté de la Semliki (LIPPENS, p. 59) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 219).
 99. — *Numenius phaeopus phaeopus* (LINNÉ). — Cité de la Semliki (LIPPENS, p. 61).

Fam. GLAREOLIDAE.

100. — *Cursorius temminckii temminckii* SWAINSON. — Signalé de l'embouchure de la Semliki (SCHOUTEDEN, I, p. 51).
 101. — *Glareola pratensis fülleborni* NEUMANN. — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 357).
 102. — *Glareola nordmanni* FISCHER. — Noté de Kasindi-Beni (SCHOUTEDEN, I, p. 51).
 103. — *Galachrysis nuchalis nuchalis* GRAY. — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 357).

Fam. BURHINIDAE.

104. — *Burhinus vermiculatus vermiculatus* (CABANIS). — Noté de la vallée de la Semliki (LIPPENS, p. 44) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 219).

Fam. JACANIDAE.

105. — *Actophilornis africanus* (GMELIN). — Noté de la Semliki (LIPPENS, p. 45) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 220).

Fam. LARIDAE.

106. — *Gelochelidon nilotica nilotica* (GMELIN). — Signalé de la Semliki (LIPPENS, p. 67).
 107. — *Chlidonias leucoptera* (TEMMINCK). — Signalé de Kasindi (SCHOUTEDEN, I, p. 52).

Fam. COLUMBIDAE.

108. — *Columba arquatrix arquatrix* TEMMINCK et KNIP. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 226; SASSI, I, p. 351), de la Semliki (coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE) et de la Rugetsi (coll. J. DE WILDE).
 109. — *Columba arquatrix albinucha* SASSI. — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 351; LÖNNBERG, p. 10) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 227).
 110. — *Columba unincta* CASSIN. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 226; SASSI, I, p. 350), de la Semliki (coll. HACKARS) et de Kalehe/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
 111. — *Turtur aena iriditorques* (CASSIN). — Se répand à l'Est jusqu'à la vallée de la Semliki (CHAPIN, II, p. 167).
 112. — *Streptopelia semitorquata semitorquata* (RÜPPELL). — Cité du Ruwenzori (OG-GRANT, p. 450) et de Moëra-Beni (SASSI, I, p. 353).
 113. — *Aplopelia simplex jacksoni* SHARPE. — Noté du Ruwenzori (CHAPIN, *The Ibis*, p. 359, 1927).
 114. — *Stigmatopelia senegalensis aequatorialis* (ERLANGER). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 227; SASSI, I, p. 353).
 115. — *Tympanistris tympanistris fraseri* BONAPARTE. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 227; SASSI, I, p. 353; GYLDENSTOLPE, p. 313).
 116. — *Turtur afer kilimensis* (MEARNS). — Noté de Kasindi (SASSI, I, p. 354).
 117. — *Calopelia puella brehmeri* (HARTLAUB). — Noté de Beni (SASSI, I, p. 354), de la Tungula et de la Djalele (coll. J. DE WILDE).
 118. — *Vinago calva salvadorii* DUBOIS. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 226; OG-GRANT, p. 447), de la Semliki (coll. J. DE WILDE; coll. HACKARS) et de Nyabukoko/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).

Fam. CUCULIDAE.

119. — *Cuculus canorus canorus* LINNÉ. — Noté de Beni (SASSI, I, p. 376), de Kasindi (SCHOUTEDEN, IV, p. 240) et de la Semliki (coll. HACKARS).
 120. — *Cuculus canorus telephonus* HEINE. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 247).
 121. — *Cuculus canorus gularis* STEPHENS. — Noté de Kasindi (LÖNNBERG, p. 17).
 122. — *Cuculus poliocephalus rochii* HARTLAUB. — Noté de Kasindi (LÖNNBERG, p. 16; SASSI, I, p. 376).
 123. — *Cuculus solitarius* STEPHENS. — Signalé de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 247; REICHENOW, II, p. 274; SASSI, I, p. 376), du Ruwenzori (JACKSON, *The Ibis*, p. 527, 1906), de la Semliki (coll. HACKARS) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
 124. — *Cuculus clamosus gabonensis* LAFRESNAYE. — Noté de Kasindi (LÖNNBERG, p. 17), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 139; SASSI, I, p. 377) et de la Semliki (coll. J. DE WILDE).
 125. — *Cuculus clamosus jacksoni* SHARPE. — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 17), de la Butahu et de la piste entre Lusilube et Biangolo (coll. J. DE WILDE).
 126. — *Clamator jacobinus jacobinus* (BODDAERT). — Noté de Kasindi-Beni (LÖNNBERG, p. 16).
 127. — *Clamator cafer* (LICHTENSTEIN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 246; SCHOUTEDEN, IV, p. 139; coll. HACKARS), de Kasindi et de Beni (SASSI, I, p. 376), de Lepi/Lutunguru et de Kambatule (coll. J. DE WILDE).
 128. — *Cercococcyx mechowi* CABANIS. — Noté de Beni (REICHENOW, II, p. 273; SASSI, I, p. 377), de Kalisia/Lutunguru, de Lepi/Lutunguru, de Nyabukoko/Lutunguru, de Djalele et de la forêt entre la Modidi et Djelube (coll. J. DE WILDE).
 129. — *Cercococcyx montanus montanus* CHAPIN. — Cité de Kalongi/Ruwenzori (CHAPIN, *A. M. Nov.*, n° 313, p. 6, 1928).
 130. — *Cercococcyx olivinus* SASSI. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 248).
 131. — *Chrysococcyx cupreus intermedius* HARTLAUB. — Noté de Beni (LÖNNBERG, p. 17), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 241), de la Semliki (coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE) et de Lepi/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
 132. — *Chrysococcyx flavigularis* SHELLEY. — Se répand vers l'Est jusqu'à la vallée de la Semliki (CHAPIN, II, p. 199).
 133. — *Lampromorpha klaasi* (STEPHENS). — Noté de Beni (SASSI, I, p. 379; REICHENOW, II, p. 275), de la Semliki (coll. HACKARS) et de la Rugetsi (coll. J. DE WILDE).
 134. — *Lampromorpha caprius* (BODDAERT). — Signalé de Kasindi (SASSI, I, p. 380), de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 249; coll. HACKARS), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 240; SASSI, I, p. 380) et de l'Irunga (coll. J. DE WILDE).
 135. — *Centropus grillii grillii* HARTLAUB. — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 16).
 136. — *Centropus leucogaster neumanni* ALEXANDER. — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 380).
 137. — *Centropus monachus monachus* RÜPPELL. — Signalé de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 238; coll. HACKARS) et de Beni (SASSI, I, p. 380; OG-GRANT, p. 421).
Centropus superciliosus superciliosus HEMPRICH et EHRENBERG. — Se rencontre vraisemblablement dans le secteur Nord du Parc Albert.
 138. — *Ceuthmochares aereus intermedius* SHARPE. — Noté de Beni (SASSI, I, p. 380; REICHENOW, II, p. 273; OG-GRANT, p. 423), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 239), de la Semliki (coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE), de Nyabukoko/Lutunguru, de la Kambatule et de la piste de Katuka (coll. J. DE WILDE).

Fam. MUSOPHAGIDAE.

139. — *Turacus schuetti emini* REICHENOW. — Signalé de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 238; GYLDENSTOLPE, p. 254; coll. J. DE WILDE), de Beni (OG.-GRANT, p. 421; REICHENOW, II, p. 271; SASSI, I, p. 374; LÖNNBERG, p. 15), de la forêt de Nganzl, de Kakunda, de Nyabukoka et de la vallée de la rivière Butahu (coll. J. DE WILDE).
140. — *Turacus erythrolophus* (VIEILLOT). — Signalé de Kalonge (coll. J. DE WILDE).
141. — *Gallirex johnstoni johnstoni* (SHARPE). — Signalé du Ruwenzori (SHARPE, *Bull. Brit. Orn. Cl.*, XI, p. 57, 1901; REICHENOW, II, p. 270; CHAPIN, *Nat. Hist.*, XXVII, p. 624, 1927).
- Muscophaga rossae rossae* GOULD. — Peut être attendu dans le secteur Nord du Parc Albert.
142. — *Corythaecola cristata cristata* (VIEILLOT). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 257; coll. J. DE WILDE) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 237; REICHENOW, I, t. II, p. 26; OG.-GRANT, p. 419).
143. — *Crinifer zonurus* (RÜPPELL). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 237).

Fam. PSITTACIDAE.

144. — *Psittacus erithacus erithacus* LINNÉ. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 236) et du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 266).
145. — *Poicephalus guthelmi guthelmi* (JARDINE). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 236; REICHENOW, II, p. 267).
146. — *Poicephalus meyeri saturatus* SHARPE. — Signalé de la vallée de la Semliki (OG.-GRANT, p. 439).
147. — *Agapornis pullaria ugandae* NEUMANN. — Noté de Kasindi (LÖNNBERG, p. 15; SASSI, I, p. 364; SCHOUTEDEN, I, p. 64), de Beni (REICHENOW, II, p. 288; SASSI, I, p. 364) et de la Rugetsî (coll. J. DE WILDE).
148. — *Agapornis swinderiana zenkeri* REICHENOW. — Signalé de Kasindi (SCHOUTEDEN, I, p. 64), de Beni (REICHENOW, II, p. 269), de la Lamya, de Bwanandeke, de la forêt de Nganzl (coll. J. DE WILDE) et de la vallée de la Semliki (coll. HACKARS).

Fam. CORACIIDAE.

149. — *Coracias garrulus garrulus* LINNÉ. — Signalé de la forêt de la Lamya (coll. J. DE WILDE).
150. — *Eurystomus afer rufobuccalis* REICHENOW. — Signalé de Kasindi (GYLDENSTOLPE, p. 280), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 248; LÖNNBERG, p. 19; OG.-GRANT, p. 436; SASSI, I, p. 365; REICHENOW, II, p. 286), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 286), de la Semliki (coll. HACKARS), de la Luhule/Bombe et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
151. — *Eurystomus gularis neglectus* NEUMANN. — Noté de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 282; SASSI, I, p. 365), de Kalehe/Lutunguru, de Bwanandeke et de la Malibe (coll. J. DE WILDE).
- Eurystomus glaucurus* (MÜLLER). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.

Fam. ALCEDINIDAE.

152. — *Ceryle rudis rudis* (LINNÉ). — Cité du Nord du lac Édouard (OG.-GRANT, p. 439), de Kasindi (LÖNNBERG, p. 21) et d'Ishango (coll. J. DE WILDE).
153. — *Megaceryle maxima gigantea* (SWAINSON). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 21), de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, I, p. 69; coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE) et de Mutsora (coll. J. DE WILDE).
- Alcedo quadribrachys guentheri* SHARPE. — Noté du confluent de la Morowe et de la Djeube (coll. J. DE WILDE).

154. — *Corythornis cristata cristata* (PALLAS). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 249).
155. — *Ispidina picta picta* (BODDAERT). — Signalé du Nord du lac Édouard (OG.-GRANT, p. 438), de Beni (SASSI, I, p. 365), de la forêt de Kambatule et de la rivière Butahu/Mutwango (coll. J. DE WILDE).
156. — *Myioceyx lecontei ugandae* VAN SOMEREN. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 277).
157. — *Halcyon senegalensis senegalensis* LINNÉ. — Signalé de Kasindi (SCHOUTEDEN, IV, p. 248; LÖNNBERG, p. 20), de la vallée de la Semliki (REICHENOW, II, p. 289; SCHOUTEDEN, IV, p. 248; coll. J. DE WILDE), de Beni (SASSI, I, p. 366; OG.-GRANT, p. 437), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 289) et de Kambatule (coll. J. DE WILDE).
158. — *Halcyon leucocephala hyacinthina* REICHENOW. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 248) et de Kanyabisika/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
159. — *Halcyon badia badia* VERREAUX. — Signalé de Beni (OG.-GRANT, p. 436; SCHOUTEDEN, IV, p. 249; REICHENOW, II, p. 290; LÖNNBERG, p. 20), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 290), de la Semliki, de la Kabakuli et de Bwanandeke (coll. J. DE WILDE).
160. — *Halcyon chelicuti chelicuti* (STANLEY). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 20), de Beni (SASSI, I, p. 366; SCHOUTEDEN, IV, p. 248) et de la rivière Rugetsî (coll. J. DE WILDE).
161. — *Halcyon malimbica prenticei* MEARNS. — Cité de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 249).

Fam. MEROPIDAE.

162. — *Merops apiaster* LINNÉ. — Noté de Beni (REICHENOW, II, p. 292), de Bunyakaki/Lutunguru et de Buliha/Wanzalabana (coll. J. DE WILDE).
163. — *Merops superciliosus* LINNÉ. — Signalé de la Semliki (REICHENOW, II, p. 292).
164. — *Merops persicus persicus* PALLAS. — Cité de la Semliki (coll. HACKARS), de la rivière Lusilube, de la Luhule, de la Lume, de la Bombe, de la Rugetsî et de Buliha/Wanzalabana (coll. J. DE WILDE).
165. — *Aerops albicollis* (VIEILLOT). — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 372; SCHOUTEDEN, IV, p. 251; GYLDENSTOLPE, p. 270), de la forêt de Kambatule et de Bwanandeke (coll. J. DE WILDE).
- Melittophagus variegatus lorongi* MEARNS. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
166. — *Melittophagus pusillus meridionalis* SHARPE. — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 21), de la vallée de la Semliki (REICHENOW, p. 291) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 250).
167. — *Melittophagus gularis australis* (REICHENOW). — Noté de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 251), de la vallée de la Semliki (coll. J. DE WILDE; coll. HACKARS), de Lepi/Lutunguru, de la vallée de la Kabakuli et de la Djobulo (coll. J. DE WILDE).
168. — *Melittophagus muelleri muelleri* (CASSIN). — Signalé de Beni (LÖNNBERG, p. 21; REICHENOW, II, p. 291; SASSI, I, p. 371), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 251), de la vallée de la Djalele et de la piste Mwenda-Katuka (coll. J. DE WILDE).
169. — *Melittophagus lafresnayii oreobates* SHARPE. — Signalé du Ruwenzori (CHAPIN, II, p. 306), de Kalehe/Lutunguru, de Kallsia/Lutunguru, et de Kalonge (coll. J. DE WILDE).
- Melittophagus bullocki frenatus* (HARTLAUB). — Peut être attendu dans la région.

Fam. BUCEROTIDAE.

170. -- *Bycanistes sharpii duboisi* W. SCLATER. — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 274) et de Beni (REICHENOW, II, p. 287).
171. -- *Bycanistes cylindricus albotibialis* (CABANIS ET REICHENOW). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 273), de Beni (LÖNNBERG, p. 19; REICHENOW, II, p. 287), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 247) et de Mutwanga/Ruwenzori (coll. FRECHKOP, p. 26).
172. -- *Bycanistes subcylindricus subquadratus* CABANIS. — Signalé de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 273; REICHENOW, II, p. 287), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 247) et de Bwanandeke (coll. J. DE WILDE).
173. -- *Lophoceros metanotus gelaensis* NEUMANN. — Noté de Kasindi (LÖNNBERG, p. 20), de Beni (REICHENOW, II, p. 288; SCHOUTEDEN, IV, p. 247), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 288) et de la Lume (coll. J. DE WILDE).
174. -- *Lophoceros fasciatus fasciatus* (SHAW). — Signalé de Beni (LÖNNBERG, p. 20; GYLDENSTOLPE, p. 272; REICHENOW, II, p. 288; OG.-GRANT, p. 432), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 247), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 288) et de la Tungula (coll. J. DE WILDE).
175. -- *Lophoceros hartlaubi granti* HARTERT. — Noté de Beni (SASSI, I, p. 368).
176. -- *Lophoceros camurus camurus* (CASSIN). — Signalé de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 272; LÖNNBERG, p. 20; SASSI, I, p. 368), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 247) et de la forêt entre la Biangolo et Modidi (coll. J. DE WILDE).
177. -- *Tropicranus albocristatus cassini* (FINSCH). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 247; SASSI, I, p. 369) et de la Djobulo (coll. J. DE WILDE).
178. -- *Ceratogymna atrata* (TEMMINCK). — Signalé de Beni (LÖNNBERG, p. 19), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 287) et de Bwanandeke (coll. J. DE WILDE).

Fam. UPUPIDAE.

179. -- *Upupa epops senegalensis* SWAINSON. — Cité de Lubango/lac Edouard (coll. FRECHKOP, p. 26).
180. -- *Upupa epops africana* BECHSTEIN. — Noté de Mangwa/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).

Fam. PHOENICULIDAE.

181. -- *Phoeniculus bollei jacksoni* (SHARPE). — Signalé de Beni (REICHENOW, II, p. 293; OG.-GRANT, p. 433) et des environs de Lutunguru: Bilati et Nyabukoko (coll. J. DE WILDE).
- Phoeniculus purpureus niloticus* (NEUMANN). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
182. -- *Scopelus castaneiceps adolphi-friederici* REICHENOW. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 271; coll. HACKARS), de Beni (SASSI, I, p. 370; REICHENOW, II, p. 293), de la Djelube, de la Butahu et de la forêt de Kambatule (coll. J. DE WILDE).
183. -- *Rhinopomastus cyanomelas schalowi* NEUMANN. — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 22), de Beni (SASSI, I, p. 370; REICHENOW, II, p. 293), de la Rugetsi et de la Kambatule (coll. J. DE WILDE).

Fam. STRIGIDAE.

- Asio abyssinicus graueri* SASSI. — Peut être attendu dans la région (CHAPIN, II, p. 402).
184. -- *Strix woodfordii nuchalis* (SHARPE). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 236; LÖNNBERG, p. 15) et de la Semliki (coll. HACKARS).
185. -- *Otus senegalensis ugundae* NEUMANN. — Signalé de Kadindia (SCHOUTEDEN, I, p. 75).
186. -- *Glaucidium capense castaneum* REICHENOW. — Signalé d'Andundi/vallée de la Semliki (REICHENOW, *Orn. Monatsber.*, p. 62, 1893).
187. -- *Glaucidium tephronotum kivuense* VERHEYEN. — Noté de la forêt de Kambatule (coll. J. DE WILDE).
188. -- *Bubo lacteus* (TEMMINCK). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 235; REICHENOW, II, p. 265).
189. -- *Bubo poensis poensis* FRASER. — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 361).
190. -- *Bubo africanus cinerascens* GUÉRIN. — Signalé de la vallée de la Semliki (CHAPIN, II, p. 384).

Fam. CAPRIMULGIDAE.

191. -- *Caprimulgus europaeus europaeus* LINNÉ. — Signalé de Beni (CHAPIN, II, p. 424).
192. -- *Caprimulgus europaeus unwinii* HUME. — Signalé de Beni (CHAPIN, II, p. 425).
193. -- *Caprimulgus tristigma tristigma* RÜPPELL. — Signalé de Kasindi et de Beni (CHAPIN, II, p. 408).
194. -- *Caprimulgus natalensis chadensis* ALEXANDER. — Signalé de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 253).
195. -- *Caprimulgus pectoralis nigricapularis* REICHENOW. — Noté de Beni (CHAPIN, II, p. 419).
196. -- *Caprimulgus batesi* SHARPE. — Cité de la Semliki-Ruwenzori (CHAPIN, II, p. 421).
197. -- *Caprimulgus poliocephalus ruwenzorii* OG.-GRANT. — Signalé de Kasindi (SASSI, I, p. 373) et du Ruwenzori (CHAPIN, *The Ibis*, p. 359, 1927).
198. -- *Caprimulgus fossii welwitschi* BOCAGE. — Noté de Kasindi (SASSI, I, p. 373; GYLDENSTOLPE, p. 265; LÖNNBERG, p. 22).
199. -- *Cosmetornis vexillarius* (GOULD). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 22; SASSI, I, p. 373) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 254).

Fam. MICROPODIDAE.

200. -- *Micropus apus pekinensis* (SWINHOE). — Signalé de Beni (CHAPIN, II, p. 458).
- Micropus pallidus niansae* (REICHENOW). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
- Micropus batesi* (SHARPE). — Peut être attendu dans la région.
201. -- *Micropus melba melba* (LINNÉ). — Cité du Ruwenzori (SCLATER ET M.-PRAED, *The Ibis*, p. 653, 1919).
202. -- *Micropus melba maximus* (OG.-GRANT). — Signalé du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 428; CHAPIN, II, p. 463).
203. -- *Micropus aequatorialis aequatorialis* (v. MÜLLER). — Cité du Ruwenzori (REICHENOW, *Orn. Monatsber.*, p. 161, 1908; CHAPIN, II, p. 460), de la vallée de la Semliki ainsi que de la plaine au Nord du lac Edouard (CHAPIN, II, p. 461).
- Micropus caffer streubelii* (HARTLAUB). — Noté de la Semliki (coll. HACKARS).

204. — *Cypsiurus parvus myochrous* (REICHENOW). — Signalé de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 264).
 205. — *Chaetura ussheri sharpei* NEUMANN. — Cité de Beni (CHAPIN, II, p. 444).
Neafrapus cassini (W. SCLATER). — Peut être attendu dans la région.
 206. — *Chaetura sabinii ogowensis* NEUMANN. — Signalé de la Semliki et de Beni (CHAPIN, II, p. 442).

Fam. COLIIDEAE.

207. — *Colius striatus leucophthalmus* CHAPIN. — Signalé de Beni (CHAPIN, Journ. f. Ornith., Festschr. E. Hartert, pp. 175, 177, 178, fig. 1, 1929).
 208. — *Colius striatus kwuensis* REICHENOW. — Signalé du Ruwenzori (SCHOUTEDEN, IV, p. 245; C. GRANT, The Ibis, p. 403, 1915; CHAPIN, II, p. 475) et de la Butahu-Mutwanga (coll. J. DE WILDE).
 209. — *Trocolius macrourus griseogularis* VAN SOMEREN. — Signalé de Kasindi (SASSI, I, p. 374) et du Ruwenzori (SCHOUTEDEN, IV, p. 245).

Fam. TROGONIDAE.

210. — *Apaloderma narina brachyurum* CHAPIN. — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 374; REICHENOW, II, p. 284) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 245; GYLDENSTOLPE, p. 259), forêt de la Semliki, forêt de Kakunda, piste de Katuka entre Biangolo et Modidi (coll. J. DE WILDE).
Apaloderma aequatoriale SHARPE. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
 211. — *Heterotrogon vittatus camerunensis* REICHENOW. — Signalé de Kianiamakue/Lutunguru, de Nyabukoko/Lutunguru et de Lepi/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).

Fam. CAPITONIDAE.

212. — *Melanobucco bidentatus aequatorialis* SHELLEY. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 241), de la Semliki, de la Butahu et de Wanzalabana (coll. J. DE WILDE).
 213. — *Tricholaema hirsutum ansargii* SHELLEY. — Noté de Beni (REICHENOW, IV, p. 277; SASSI, I, p. 383), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 242), de la Semliki (coll. HACKARS), de la Kabakuli, de la Turgula et de Kambatule (coll. J. DE WILDE).
 214. — *Tricholaema lacrymosum radcliffei* OG.-GRANT. — Signalé de Kasindi (SASSI, I, p. 383).
 215. — *Gymnobucco bonapartei intermedius* VAN SOMEREN. — Cité de Beni (SASSI, I, p. 384), de la Semliki (coll. HACKARS), de Nyabukoko/Lutunguru, de la Kabakuli et de la forêt de Nyanzi (coll. J. DE WILDE).
 216. — *Gymnobucco sladeni* OG.-GRANT. — Signalé de la Semliki (CHAPIN, II, p. 514) et de Beni (SASSI, I, p. 384; REICHENOW, Orn. Monatsber., p. 160, 1908).
 217. — *Buccanodon duchallui duchallui* (CASSIN). — Cité du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 278), de la Djelube, de la Djobulo, de la Kabakuli, de Bwanandeke (coll. J. DE WILDE) et de la Semliki (coll. HACKARS).
 218. — *Viridibucco coryphaeus jacksoni* W. SCLATER. — Cité du Ruwenzori (CHAPIN, II, p. 493).
 219. — *Pogoniulus chrysoconus centralis* (REICHENOW). — Cité du Ruwenzori et de Kasindi (CHAPIN, II, p. 497).
 220. — *Pogoniulus erythronotus* (CUVIER). — Cité du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 279) et de Biangolo (coll. J. DE WILDE).

221. — *Pogoniulus leucolaima leucolaima* (VERREAUX). — Noté de Beni (REICHENOW, II, p. 499; SASSI, I, p. 385).
 222. — *Pogoniulus leucolaima mfumbri* (OG.-GRANT). — Cité du Ruwenzori (GYLDENSTOLPE, p. 242; CHAPIN, II, p. 503), de la Semliki (coll. HACKARS), de la Djelube et de Bwanandeke (coll. J. DE WILDE).
 223. — *Pogoniulus subsulphureus flavimentum* (VERREAUX). — Signalé de la vallée de la Semliki (CHAPIN, II, p. 505) et de Beni (SASSI, I, p. 385).
 224. — *Pogoniulus scolopaceus flavisquamatus* (VERREAUX). — Noté de Beni (SASSI, I, p. 386).
 225. — *Trachylaemus purpuratus elgonensis* (SHARPE). — Noté de Beni (SASSI, I, p. 386; CHAPIN, II, p. 490), du Ruwenzori (CHAPIN, II, p. 490), de la Semliki (coll. HACKARS), de la Turgula, de la Luhule, de Bwanandeke, de la forêt de Kambatule et de la piste de Katuka (coll. J. DE WILDE).

Fam. INDICATORIDAE.

226. — *Indicator indicator* (SPARRMAN). — Signalé de Kasindi (SASSI, I, p. 381).
 227. — *Indicator variegatus variegatus* LESSON. — Signalé de Kasindi (SASSI, I, p. 381).
 228. — *Indicator maculatus stictithorax* REICHENOW. — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 381) et de la Semliki (coll. J. DE WILDE).
 229. — *Melignotheres minor riggenbachi* (ZEBLITZ). — Noté du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 275).
 230. — *Melignotheres controstris controstris* CASSIN. — Signalé de Beni (CHAPIN, II, p. 544), du Ruwenzori (CHAPIN, II, p. 545) et de la forêt de Nganzai (coll. J. DE WILDE).
 231. — *Melignotheres exilis exilis* CASSIN. — Noté du Ruwenzori (CHAPIN, II, p. 540) et de la Semliki (coll. HACKARS).
 232. — *Melignomon zenkeri* REICHENOW. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 241).
Melichneutes robustus (BATES). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
Prodotiscus insignis insignis (CASSIN). — Peut être attendu dans ce secteur (SASSI, I, p. 382; CHAPIN, II, p. 535).

Fam. PICIDAE.

233. — *Campethera permista permista* (REICHENOW). — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 388) et de Bwanandeke (coll. J. DE WILDE).
 234. — *Campethera caroli caroli* (MALHERBE). — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 388).
 235. — *Campethera nivosa herberti* (ALEXANDER). — Signalé de Beni (SASSI, I, p. 389) et de la Semliki (coll. HACKARS).
 236. — *Campethera nubica nubica* (BODDAERT). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 17; CHAPIN, II, p. 563), de Kasindi-Beni (SASSI, I, p. 387; REICHENOW, II, p. 281) et de la vallée de la Semliki (OG.-GRANT, p. 411; SCHOUTEDEN, IV, p. 243).
 237. — *Dendropicos fuscescens camerunensis* SHARPE. — Noté de Kasindi (SASSI, I, p. 390), de Beni (REICHENOW, II, p. 283; SASSI, I, p. 390) et de Wanzalabana (coll. J. DE WILDE).
 238. — *Dendropicos fuscescens lepidus* CABANIS ET HEINE. — Cité du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 283; CHAPIN, II, p. 584).
 239. — *Dendropicos poecilolaemus* REICHENOW. — Signalé du Ruwenzori (CHAPIN, II, p. 585).

240. — *Dendropicos gabonensis* (VERREAUX). — Cité de Beni (SASSI, I, p. 391; GYLDENSTOLPE, p. 234) et du Ruwenzori (CHAPIN, II, p. 586).
241. — *Thripias namaquus decipiens* (SHARPE). — Signalé de Kasindi (SASSI, I, p. 391; LÖNNBERG, p. 18).
242. — *Mesopicos goertae centralis* REICHENOW. — Signalé de Kasindi-Beni (SASSI, I, p. 391) et de l'ancienne Mission Saint-Gustave (SCHOUTEDEN, IV, p. 243).
243. — *Mesopicos griseocephalus ruwenzorii* SHARPE. — Cité de Kalonge (coll. J. DE WILDE).
244. — *Mesopicos zantholophus* (HARGITT). — Signalé de Beni (REICHENOW, II, p. 282; SASSI, I, p. 393), de la Semliki (coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE), de la Kabakuli et de Nyabukoko/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
245. — *Pollipicus elliotii* CASSIN. — Cité de Beni (SASSI, I, p. 392).

Fam. EURYLAEMIDAE.

246. — *Smithornis rufolateralis budongoensis* VAN SOMEREN. — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 225; coll. HACKARS), de Beni (SASSI, II, p. 254; REICHENOW, II, p. 304) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 258).
247. — *Smithornis sharpei eurylaemus* NEUMANN. — Signalé de Beni (OG.-GRANT, p. 402).
248. — *Smithornis capensis camerunensis* SHARPE. — Noté des environs de Lutunguru : Bilati, Kalehe (coll. J. DE WILDE).

Fam. PITTIDAE.

249. — *Pitta reichenowi* MADARASZ. — Noté de Beni (SASSI, II, p. 240) et de Mutwanga/Ruwenzori (coll. FRECHKOP, p. 29).

Fam. ALAUDIDAE.

250. — *Motacilla aguimp vidua* SUNDEVALL. — Signalé de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 280).
251. — *Budytes flavus flavus* (LINNÉ). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 280).
252. — *Budytes flavus thunbergi* (BILLBERG). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXXIII, fasc. 4, p. 323, 1940).
253. — *Budytes flavus flavissimus* (BLYTH). — Signalé de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXXIII, fasc. 4, p. 323, 1940).
254. — *Anthus richardi lacum* MEINERTZHAGEN. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, *Rev. Zool. Bot. Afr.*, XXXIII, p. 317, 1940).
255. — *Anthus leucophrys zenkeri* NEUMANN. — Noté de Beni (OG. GRANT, p. 313).
256. — *Anthus trivialis trivialis* LINNÉ. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 280).
257. — *Macronyx croceus croceus* (VIEILLIOT). — Cité de Kasindi (SCHOUTEDEN, I, p. 89), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 280), de Vieux-Radiadia, de la Butahu, de la Luhule et de la forêt de Kamanegu (coll. J. DE WILDE).

Fam. TIMALIIDAE.

258. — *Turdoides jardinei emini* (NEUMANN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 166).
259. — *Turdoides melanops sharpei* (REICHENOW). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 166), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 293) et de la Luhule (coll. J. DE WILDE).

260. — *Phyllanthus atripennis bohndorffi* (SHARPE). — Signalé de Beni (LÖNNBERG, p. 28; SASSI, II, p. 275; SCHOUTEDEN, IV, p. 293), des forêts de Nganzi, de la Luhule/Bombe et de la Biangolo (coll. J. DE WILDE) et de la Semliki (coll. HACKARS).
261. — *Illadopsis fulvescens ugandae* (VAN SOMEREN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 169; coll. HACKARS), de Beni (SASSI, II, p. 276) et de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).
262. — *Illadopsis rufipennis barakae* (JACKSON). — Noté de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 170).
263. — *Pseudoalcippe atriceps atriceps* (SHARPE). — Cité de Beni (REICHENOW, II, p. 371), du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 381) et de Kalonge (coll. J. DE WILDE).
264. — *Pseudoalcippe pyrropterus* (REICHENOW et NEUMANN). — Signalé de Lepi-Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
265. — *Macrosphenus flavicans hypochondriacus* (REICHENOW). — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 167; OG.-GRANT, p. 378) et de Beni (SASSI, II, p. 275).
266. — *Macrosphenus concolor* (HARTLAUB). — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 168) et de Beni (SASSI, II, p. 275).
Graueria vittata HARTERT. — Se rencontre vraisemblablement dans la région

Fam. PYCNONOTIDAE.

267. — *Pycnonotus barbatus minor* HEUGLIN. — Signalé de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 284; GYLDENSTOLPE, p. 188; coll. HACKARS) et de Beni (SASSI, II, p. 273; OG.-GRANT, p. 388).
268. — *Trichophorus chloronotus weileri* (GYLDENSTOLPE). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 281), de la Turgula, de la forêt de Kakunda et du confluent de la Modidi et de la Biangolo (coll. J. DE WILDE).
269. — *Trichophorus calurus ndussumensis* (REICHENOW). — Signalé de Beni (REICHENOW, II, p. 345; SASSI, II, p. 262; SCHOUTEDEN, IV, p. 281; OG.-GRANT, p. 381; LÖNNBERG, p. 28), de la Semliki, de la Biangolo, de la Butahu et des forêts de Kakunda et Nganzi (coll. J. DE WILDE).
270. — *Bleda syndactyla woosnami* OG.-GRANT. — Noté de Beni (SASSI, II, p. 263; SCHOUTEDEN, IV, p. 281), de la Semliki, de la Butahu et de Lutunguru : Lepi, Kalista (coll. J. DE WILDE).
271. — *Bleda ezimia ugandae* VAN SOMEREN. — Signalé de Beni (SASSI, II, p. 263; SCHOUTEDEN, IV, p. 281).
272. — *Thescotichla leucopleura* (CASSIN). — Signalé de Beni (SASSI, II, p. 269; SCHOUTEDEN, IV, p. 282), de la Semliki (coll. HACKARS), de la Turgula et de la forêt de Katuka entre la Biangolo et la Modidi (coll. J. DE WILDE).
273. — *Atimastillas flavicollis pallidigula* (SHARPE). — Noté de Beni (SASSI, II, p. 265) de la Semliki (coll. HACKARS) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
274. — *Pyrhurus scandens orientalis* (HARTLAUB). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 282).
275. — *Baeopogon indicator chlorosaturata* (VAN SOMEREN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 178; coll. J. DE WILDE), de Beni (SASSI, II, p. 269; OG.-GRANT, p. 384; REICHENOW, II, p. 342) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 282).
276. — *Ixonotus guttatus* VERREAUX. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 176; coll. HACKARS), de Beni (LÖNNBERG, p. 28; SASSI, II, p. 273) de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 284), de la Luhule/Bombe, de Rwanandeke et du confluent de la Morowe et de la Djelube (coll. J. DE WILDE).
Phyllastrephus sucosus sucosus REICHENOW. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.

277. — *Phyllastrephus flavostriatus graueri* NEUMANN. — Signalé des environs de Lutunguru : Kanyabisika, Nyabukoko et Lepi (coll. J. DE WILDE).
278. — *Phyllastrephus hypochloris* JACKSON. — Signalé de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 176; SASSI, II, p. 265) et de la Semliki (coll. J. DE WILDE).
Phyllastrephus lorenzi SASSI. — Peut être attendu dans la région.
279. — *Phyllastrephus albigularis albigularis* (SHARPE). — Cité de Beni (OG.-GRANT, p. 383; SASSI, II, p. 268).
280. — *Argaleocichla icterina sethsmithi* (HARTERT et NEUMANN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 178), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 282; SASSI, II, p. 264), du confluent de la Modidi et de la Biangolo, et de la Kabakuli (coll. J. DE WILDE).
281. — *Arizelocichla tephrolaema kikuyuensts* (SHARPE). — Cité du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 342), de Kalonge et de la forêt de Kamanegu (coll. J. DE WILDE).
282. — *Arizelocichla masukuensis kakemegae* SHARPE. — Signalé de Lutunguru : Kanyabisika et de Kianiamakue (coll. J. DE WILDE).
283. — *Chlorocichla laetissima* (SHARPE). — Signalé de Beni (SASSI, II, p. 270), de la Semliki (coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE), de la Butahu, de la Kabakuli, de la piste entre les rivières Lusilube et Biangolo, et de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).
284. — *Chlorocichla simplex* (HARTLAUB). — Cité de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 282; SASSI, II, p. 266) et de la Semliki (coll. J. DE WILDE).
285. — *Stelgidillas gracilirostris gracilirostris* (STRICKLAND). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 183), de Beni (REICHENOW, II, p. 344; SASSI, II, p. 271) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 283).
Calypocichla serina (VERREAUX). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
286. — *Charitillus gracilis gracilis* (CABANIS). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 184; OG.-GRANT, p. 385; coll. HACKARS), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 283) et de la piste de Katuka entre la rivière Lusilube et la Biangolo (coll. J. DE WILDE).
287. — *Andropadus curvirostris* CASSIN. — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 181), de Beni (SASSI, II, p. 272; LÖNNBERG, p. 28; SCHOUTEDEN, IV, p. 283) et de la forêt entre la Biangolo et Modidi (coll. J. DE WILDE).
288. — *Stelgidocichla latirostris eugenia* (REICHENOW). — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 185), de Beni (SASSI, II, p. 271; REICHENOW, II, p. 345; SCHOUTEDEN, IV, p. 283), de la Kabakuli, de Kalonge et de Kalehe/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
289. — *Eurillas virens virens* (CASSIN). — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 186; coll. HACKARS), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 283; SASSI, II, p. 270; REICHENOW, II, p. 344; OG.-GRANT, p. 385) et de Butahu (coll. J. DE WILDE).

Fam. MUSCICAPIDAE.

290. — *Muscicapa striata striata* (PALLAS). — Noté de Beni (SASSI, II, p. 246) et de Buliha/Wanzalabana (coll. J. DE WILDE).
291. — *Alseonax minimus pumilus* REICHENOW. — Signalé de Beni (REICHENOW, II, p. 301) et du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 391).
292. — *Alseonax aquaticus infulatus* (HARTLAUB). — Cité de Beni (SASSI, II, p. 243), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 256) et du Ruwenzori (W. L. SCLATER, *Syst. Av. Aethiopicarum*, p. 400, 1930).

293. — *Alseonax olivascens* (CASSIN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 198).
294. — *Alseonax epulatus* (CASSIN). — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 201) et de Beni (REICHENOW, II, p. 301; OG.-GRANT, p. 392).
295. — *Alseonax flavipes* BATES. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 202).
296. — *Alseonax cinereus cinereus* (CASSIN). — Noté de Beni (SASSI, II, p. 245).
297. — *Alseonax griseogularis griseogularis* JACKSON. — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 197) et de Beni (SASSI, II, p. 245).
298. — *Parisoma plumbeum plumbeum* (HARTLAUB). — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 196; coll. HACKARS) et de Beni (OG.-GRANT, p. 395).
Bradornis pallidus suahelicus VAN SOMEREN. — Se rencontre probablement dans la région.
299. — *Dioptrornis toroensis* (HARTERT). — Signalé de Kalehe/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
300. — *Melaenornis ardesiaca* BERLIOZ. — Signalé de Lutunguru : Nyabukoko, Kalehe (coll. J. DE WILDE).
301. — *Melaenornis edoloides ugandae* VAN SOMEREN. — Cité de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 194), de Kasindi (SASSI, II, p. 246; LÖNNBERG, p. 23) et de la Rugetsi (coll. J. DE WILDE).
302. — *Melaenornis pammelaina tropicalis* (CABANIS). — Signalé de Kasindi-Beni (SASSI, II, p. 246).
303. — *Fraseria ocreata ocreata* (STRICKLAND). — Cité de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 124) et des forêts de Nganzi, de Kakunda et de la Turgula (coll. J. DE WILDE).
304. — *Pedilornhynchus cimotatus stuhlmanni* REICHENOW. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 203) et de Beni (OG.-GRANT, p. 392; SCHOUTEDEN, IV, p. 256; SASSI, II, p. 247).
Pedilornhynchus tessmanni REICHENOW. — Peut être attendu dans ce secteur.
305. — *Artomyias fuliginosa minuscula* GROTE. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 205), de Beni (GROTE, *Anz. Orn. Ges. Bayern*, n° 7, p. 58, 1922; OG.-GRANT, p. 402; SCHOUTEDEN, IV, p. 257; REICHENOW, II, p. 302; SASSI, II, p. 255) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
306. — *Chloropeta natalensis massaica* FISCHER et REICHENOW. — Noté de Beni (OG.-GRANT, p. 392) et du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 302).
307. — *Chloropeta gracilirostris* OG.-GRANT. — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, *Bull. Brit. Orn. Cl.*, XIX, p. 33, 1906).
308. — *Stizorhina fraseri vulpina* REICHENOW. — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 204; coll. HACKARS), de Beni (OG.-GRANT, p. 393; SCHOUTEDEN, IV, p. 257; REICHENOW, II, p. 303; LÖNNBERG, p. 23; SASSI, II, p. 246), de la piste de Katuka entre les rivières Lusilube et Biangolo, de la forêt de Kakunda, de Bwanandeke, de la rivière Lusilube et Biangolo, de la forêt de Mutsora (coll. J. DE WILDE).
309. — *Megabyas flammulatus aequatorialis* JACKSON. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 257; REICHENOW, II, p. 303), de la Semliki (coll. HACKARS), de la Djobulo et de Bwanandeke (coll. J. DE WILDE).
310. — *Bias musicus feminina* JACKSON. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 214; coll. J. DE WILDE; coll. HACKARS), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 258) et de Bambia/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
Hyliota flavigaster flavigaster SWAINSON. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.

311. — *Hylota slatini* SASSI. — Signalé de Beni (SASSI, *Anz. Akad. Wien*, p. 308, 1914).
312. — *Batis diops* JACKSON. — Cité du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 304).
Batis mollor puella REICHENOW. — Peut être attendu dans ce secteur.
313. — *Batis minor nyanzae* NEUMANN. — Signalé de Kasindi (SASSI, II, p. 250).
314. — *Batis ituriensis* CHAPIN. — Signalé de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 211).
315. — *Platystetra cyanea nyanzae* NEUMANN. — Cité de Beni (SASSI, II, p. 253; GYLDENSTOLPE, p. 264; SCHOUTEDEN, IV, p. 259), du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 399) et de la Semliki (coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE).
316. — *Dyaphorophya castanea castanea* (FRASER). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 211; coll. HACKARS) et de Beni (OG.-GRANT, p. 398; SCHOUTEDEN, IV, p. 259; REICHENOW, II, p. 305; SASSI, II, p. 250).
317. — *Dyaphorophya blissetti jamesoni* SHARPE. — Cité de Beni (OG.-GRANT, p. 399; SASSI, II, p. 251), de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 213) et de la Djelube (coll. J. DE WILDE).
318. — *Dyaphorophya ansorgei graueri* HARTERT. — Signalé de Kianiamakue/Lutunguru et de la piste de Katuka entre les rivières Lusilube et Biangolo (coll. J. DE WILDE).
319. — *Erythrocerus mecalii congitus* OG.-GRANT. — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 215).
320. — *Erannornis longicauda teresita* (ANTINORI). — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 222), de Kasindi-Beni (SASSI, II, p. 260) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 259; REICHENOW, II, p. 305).
Trochocercus albonotatus albonotatus SHARPE. — Peut être attendu dans ce secteur.
321. — *Trochocercus nitens nitens* CASSIN. — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 171) et de Beni (SASSI, II, p. 256).
322. — *Trochocercus nigromitratus intensus* GYLDENSTOLPE. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 216) et de Beni (REICHENOW, II, p. 306; SASSI, II, p. 256).
Trochocercus albiventris toroensis JACKSON. — Se rencontre vraisemblablement dans ce secteur.
323. — *Tchitrea viridis speciosa* (CASSIN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 218; SCHOUTEDEN, IV, p. 260; REICHENOW, II, p. 306; coll. HACKARS), de Beni (SASSI, II, p. 257; OG.-GRANT, p. 404), de Bwanandeke, de Kalonge et de Mongwa/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
324. — *Tchitrea smithii ignea* REICHENOW. — Cité de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 220) et de Beni (OG.-GRANT, p. 406; SASSI, II, p. 258; LÖNNBERG, p. 23).
325. — *Tchitrea melampyra batesi* (CHAPIN). — Signalé de la vallée de la Semliki (SASSI, II, p. 258).
326. — *Tchitrea nigriceps emini* (REICHENOW). — Noté de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 260; REICHENOW, II, p. 307; coll. J. DE WILDE), du confluent des rivières Modidi et Biangolo, de Bwanandeke et de Nyabukoko/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
Seicercus umbrovirens alpinus (OG.-GRANT). — Peut être attendu dans la région. Est signalé en passant par J. CHAPIN dans la préface de son livre (CHAPIN, I, p. 257).
327. — *Seicercus laetus* (SHARPE). — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 407).

Fam. TURDIDAE.

328. — *Turdus olivaceus centralis* REICHENOW. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 154), de Beni (OG.-GRANT, p. 369; SCHOUTEDEN, IV, p. 294; SASSI, II, p. 283) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
Turdus olivaceus baraka (SHARPE). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
329. — *Geocichla gurneyi oberlaenderi* SASSI. — Signalé de Beni-Mawambi (SASSI, II, p. 280).
Geocichla cameronensis graueri SASSI. — Peut être attendu dans la région.
330. — *Geocichla princei pileletti* SCHOUTEDEN. — Signalé de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 294) et de la piste de Katuka entre la Lusilube et la Biangolo (coll. J. DE WILDE).
331. — *Neocossyphus rufus arrhenti* LÖNNBERG. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 162), de Beni (LÖNNBERG, p. 30; SASSI, II, p. 286), de la Kabakuli et de la Luhulu (coll. J. DE WILDE).
332. — *Neocossyphus poensis praepectoralis* JACKSON. — Noté de Beni (SASSI, II, p. 287), de la Semliki (coll. HACKARS) et de Lutunguru : Mangwa, Kianiamakue (coll. J. DE WILDE).
Cercomela familiaris falkensteini (CABANIS). — Se rencontre vraisemblablement dans ce secteur.
333. — *Thamnolaea cinnamomeiventris subrufipennis* REICHENOW. — Cité de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 295).
334. — *Myrmecocichla nigra* (VIEILLIOT). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 165) et de Beni (SASSI, II, p. 293).
335. — *Saxicola torquata axillaris* (SHELLEY). — Signalé de Kalehe/Lutunguru et de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).
336. — *Saxicola rubetra* (LINNÉ). — Signalé de Beni (REICHENOW, II, p. 370).
337. — *Cossypha heuglini heuglini* HARTLAUB. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 296).
338. — *Cossypha roberti rufescentior* HARTERT. — Signalé de Kianiamakue/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
339. — *Cossypha archeri archeri* SHARPE. — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 372) et de Kalonge (coll. J. DE WILDE).
340. — *Cossypha cyanocampter barttelotti* SHELLEY. — Noté de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 296; coll. J. DE WILDE), de Beni (LÖNNBERG, p. 32; SASSI, II, p. 285), de Bwanandeke, de la Lusilube, de la forêt de Nganzi et de la piste de Katuka entre la Lusilube et la Biangolo (coll. J. DE WILDE).
341. — *Cossypha niveicapilla melanonota* (CABANIS). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 296; OG.-GRANT, p. 372; LÖNNBERG, p. 32).
342. — *Sheppardia cyornithopsis lopezi* (ALEXANDER). — Noté de Beni (SASSI, II, p. 292).
343. — *Alethe castanea woosnami* OG.-GRANT. — Signalé de Beni (SASSI, II, p. 289).
344. — *Alethe poliocephala carruthersi* OG.-GRANT. — Signalé de Beni (SASSI, II, p. 290), de la Semliki (coll. HACKARS), de la Butahu, de la Biangolo et de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).
345. — *Alethe poliopteryx* SHARPE. — Cité des environs de Lutunguru : Mangwa, Kianiamakue, Kanyabisika et Nyabukoko (coll. J. DE WILDE).
Alethe poliothorax REICHENOW. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
Erythropygia leucophrys vansomereni W. SCLATER. — N'a pas encore été signalé de la région.

346. — *Erythropygia hartlaubi* REICHENOW. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 297; SASSI, II, p. 289), de la Semliki (coll. HACKARS) et de la Rugetsi (coll. J. DE WILDE).
 347. — *Erythropygia collisi collisi* ALEXANDER. — Noté de Beni (SASSI, II, p. 289).
 348. — *Pogonocichla stellata ruwenzorii* (OG.-GRANT). — Cité de Beni (OG.-GRANT, p. 374; SCHOUTEDEN, IV, p. 297) et des environs de Lutunguru : Kianiamakue, Nyabukoko, Kanyabisika et Kalonge (coll. J. DE WILDE).

Fam. SYLVIIDAE.

349. — *Sylvia borin borin* (BODDAERT). — Signalé de Buliha/Wanzalabana (coll. J. DE WILDE).
 350. — *Acrocephalus baeticus cinnamomeus* REICHENOW. — Cité de la rive Nord du lac Edouard (REICHENOW, II, p. 361).
 351. — *Phylloscopus trochilus evermanni* (BONAPARTE). — Cité de Beni (SASSI, II, p. 300; REICHENOW, II, p. 365).
 352. — *Bradypterus cinnamomeus* (RÜPPELL). — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 355; REICHENOW, II, p. 360).
Bradypterus barakae SHARPE. — N'a pas encore été signalé de la région.
Bradypterus alfredi albicristatus NEUMANN. — Se rencontre vraisemblablement dans ce secteur.
Calamornis rufescens foxi W. SCLATER. — Peut être attendu dans ce secteur.
 353. — *Calamornis nilotica* (NEUMANN). — Signalé de Beni (OG.-GRANT, p. 356).
Calamornis leptorhyncha jacksoni (NEUMANN). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
 354. — *Schoenicola brevirostris* (SUNDEVALL). — Cité du Nord du lac Edouard (REICHENOW, II, p. 358) et de Kasindi (SASSI, II, p. 294).
 355. — *Apalis rufogularis nigrescens* (JACKSON). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 142) et de Beni (SASSI, II, p. 300).
 356. — *Apalis binotata personata* SHARPE. — Noté du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 362).
 357. — *Apalis flavida uamensis* REICHENOW. — Cité de Beni (OG.-GRANT, p. 358).
 358. — *Apalis jacksoni jacksoni* SHARPE. — Signalé de Beni (REICHENOW, II, p. 362; SASSI, II, p. 300).
Apalis nigriceps collaris VAN SOMEREN. — Peut être attendu dans la région.
Apalis porphyrolaema affinis OG.-GRANT. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
 359. — *Apalis ruwenzorii ruwenzorii* JACKSON. — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 360) et de Nyabukoko/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
 360. — *Eminia lepidia* (HARTLAUB). — Signalé de Kasindi (SASSI, II, p. 302; REICHENOW, II, p. 363), de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 292) et de Beni (OG.-GRANT, p. 361).
Phyllolais pulchella (CRETZSCHMAR). — Peut être attendu dans la région.
 361. — *Sylvietta brachyura dilutior* REICHENOW. — Signalé de Beni (OG.-GRANT, p. 358).
 362. — *Sylvietta virens baraka* SHARPE. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 144) et de Beni (SASSI, II, p. 303; OG.-GRANT, p. 362).
 363. — *Sylvietta leucophrys leucophrys* SHARPE. — Noté du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 363; SCHOUTEDEN, IV, p. 292).
 364. — *Sylvietta denti* OG.-GRANT. — Signalé de Beni (OG.-GRANT, Bull. Brit. Orn. Cl., XIX, p. 25, 1906).

365. — *Eremomela badiceps turneri* VAN SOMEREN. — Signalé de Beni (SASSI, II, p. 303).
 366. — *Caramoptera brevicaudata abessinica* ZEDLITZ. — Noté de Beni (SASSI, II, p. 304).
 367. — *Caramoptera brevicaudata tineta* CASSIN. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 147).
 368. — *Caramoptera superciliosus flavigularis* REICHENOW. — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 148).
 369. — *Caramoptera toroensis* JACKSON. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 149) et de Beni (SASSI, II, p. 304).
 370. — *Stiphronis erythrorax mabirae* JACKSON. — Se rencontre dans la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 150).
Cisticola juncidis perennia LYNES. — Peut être attendu dans la région.
Cisticola ayrestii entebbe LYNES. — Existe vraisemblablement dans la région.
 371. — *Cisticola woosnami woosnami* OG.-GRANT. — Signalé de Kasindi (LYNES, The Ibis, suppl. numb., p. 298, 1930) et de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 135).
 372. — *Cisticola chubbi* SHARPE. — Cité du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 357).
 373. — *Cisticola erythrops sylvia* REICHENOW. — Noté de Beni (SASSI, II, p. 295) et du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 348).
 374. — *Cisticola galactotes nyansae* NEUMANN. — Signalé de Beni (REICHENOW, II, p. 356; OG.-GRANT, p. 352).
 375. — *Cisticola robusta nuchalis* REICHENOW. — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 133).
 376. — *Cisticola natalensis strangeri* (FRASER). — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 131) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 289; REICHENOW, II, p. 355).
 377. — *Cisticola natalensis valida* (HEUGLIN). — Signalé de Kasindi (GYLDENSTOLPE, p. 131).
Cisticola brachyptera ankole LYNES. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
 378. — *Melocichla mentalis amauroura* PELZELN. — Signalé de Kasindi (SASSI, II, p. 294), de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 125), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 289; SASSI, II, p. 294) et du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 346).
 379. — *Prinia mystacea immutabilis* VAN SOMEREN. — Noté de Beni (SASSI, II, p. 305; GYLDENSTOLPE, p. 151; OG.-GRANT, p. 366).
 380. — *Prinia leucopogon reichenowi* (HARTLAUB). — Signalé de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 291) et de Beni (OG.-GRANT, p. 367; SASSI, II, p. 355).
 381. — *Prinia bairdii bairdii* (CASSIN). — Signalé de Beni (OG.-GRANT, p. 367; REICHENOW, II, p. 361) et de la Semliki (coll. HACKARS).
 382. — *Bathmocercus rufus vulpinus* REICHENOW. — Cité de Beni (SASSI, II, p. 278) et de la vallée de la Butahu (coll. J. DE WILDE).

Fam. HIRUNDINIDAE.

383. — *Hirundo rustica rustica* LINNÉ. — Signalé de Beni (SASSI, II, p. 241; SCHOUTEDEN, IV, p. 254; REICHENOW, II, p. 297), de la Semliki (coll. HACKARS) et de Lutunguru : Kanyabisika (coll. J. DE WILDE).
 384. — *Hirundo rufula emini* REICHENOW. — Noté de Kasindi-Beni (SASSI, II, p. 242).
 385. — *Hirundo senegalensis senegalensis* LINNÉ. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 228) et de Beni (SASSI, II, p. 242; SCHOUTEDEN, IV, p. 255).
 386. — *Hirundo semirufa gordonii* JARDINE. — Signalé de Beni (SASSI, II, p. 242).
 387. — *Hirundo abyssinica untatis* SCLATER et PRAED. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 255).
Hirundo smithii smithii LEACH. — Peut se rencontrer dans la région.

388. — *Riparia riparia riparia* (LINNÉ). — Cité de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 254).
 389. — *Riparia cincta suahelica* VAN SOMEREN. — Noté de Kasindi (SASSI, II, p. 241).
 390. — *Psalidoprocne holomelaena ruwenzori* CHAPIN. — Signalé de Kanyabisika/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
 391. — *Psalidoprocne nitens centralis* NEUMANN. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 230), de Beni (OG.-GRANT, p. 410) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 255).
 392. — *Psalidoprocne albiceps* SCLATER. — Noté de Kasindi (SASSI, II, p. 242), de Beni (SASSI, II, p. 242) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 255).

Fam. CAMPEPHAGIDAE.

393. — *Campephaga flava* VIEILLIOT. — Cité de Kasindi et de Beni (SASSI, II, p. 261) ainsi que de Ngerere-Lepi/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
 394. — *Campephaga petiti* OUSTALET. — Signalé de la Semliki (coll. HACKARS), de la Kabakuli et de Lutunguru : Mangwa et Kalehe (coll. J. DE WILDE).
Campephaga quiscalina martini JACKSON. — Peut être attendu dans la région.
 395. — *Coracina graueri* NEUMANN. — Noté des environs de Lutunguru : Nyabukoko, Bilati, Kianiamakue (coll. J. DE WILDE).
 396. — *Coracina azurea* (CASSIN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 193), de Beni-Mawambi (SASSI, II, p. 261) et de la Djobulo (coll. J. DE WILDE).

Fam. DICRURIDAE.

397. — *Dicrurus adsimilis coracinus* VERREAUX. — Signalé de Beni (SASSI, III, p. 73; LÖNNBERG, p. 24; REICHENOW, II, p. 316; SCHOUTEDEN, IV, p. 266), de Mutwanga/Ruwenzori (coll. FRECHKOP, p. 37), de la Luhule, de Nyabukoko/Lutunguru, de Bilati/Lutunguru (coll. J. DE WILDE) et de la Semliki (coll. J. DE WILDE; coll. HACKARS).
 398. — *Dicrurus adsimilis divaricatus* (LICHTENSTEIN). — Noté de Kasindi-Beni (SASSI, III, p. 73) et du confluent des Modidi/Biangolo (coll. J. DE WILDE).
 399. — *Dicrurus atripennis* SWAINSON. — Signalé de Beni (SASSI, III, p. 73; LÖNNBERG, p. 25; REICHENOW, II, p. 316) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 266).

Fam. PRIONOPIDAE.

400. — *Prionops alberti* SCHOUTEDEN. — Noté des environs de Lutunguru : Kanyabisika, Bilati, Bambea (coll. J. DE WILDE).
 401. — *Sigmodus rufiventris mentalis* SHARPE. — Signalé de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 261; coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE), de Beni (SASSI, III, p. 21; GYLDENSTOLPE, p. 124; OG.-GRANT, p. 346), de Bwanandeke et de la forêt entre la Biangolo et Modidi (coll. J. DE WILDE).
 402. — *Nilaus afer ruwenzori* BANNERMAN. — Cité de la Luhule/Bombe (coll. J. DE WILDE).

Fam. LANIIDAE.

403. — *Lanius collaris conigicus* REICHENOW. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 265).
 404. — *Lanius excubitorius excubitorius* PRÉVOST et DES MURS. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 265), de la Luhule et de la Rugetsi (coll. J. DE WILDE).
 405. — *Lanius mackinnoni* SHARPE. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 265; REICHENOW, II, p. 315; SASSI, III, p. 22; OG.-GRANT, p. 345; LÖNNBERG, p. 24), de la Semliki et de la Butahu-Mutwanga (coll. J. DE WILDE).

406. — *Lanius minor* GMELIN. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 265).
 407. — *Lanius collurio collurio* LINNÉ. — Noté de la Semliki (coll. HACKARS), de la Rugetsi et de la forêt de Kamanegu (coll. J. DE WILDE).
 408. — *Laniarius barbarus erythrogaster* (CRETZSCHMAR). — Signalé de Kasindi (SASSI, III, p. 26; GYLDENSTOLPE, p. 116), de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 116; REICHENOW, II, p. 313; SCHOUTEDEN, IV, p. 264) et de Vieux-Radiadia (coll. J. DE WILDE).
 409. — *Laniarius leucorhynchus* (HARTLAUB). — Noté de Beni (SASSI, III, p. 27; SCHOUTEDEN, IV, p. 263; OG.-GRANT, p. 344) et de la forêt de Kambatule (coll. J. DE WILDE).
 410. — *Laniarius poenstis holomelas* (JACKSON). — Signalé du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 343; REICHENOW, II, p. 312), de Kalonge, de Nyabukoko/Lutunguru et de la forêt de Kamanegu (coll. J. DE WILDE).
 411. — *Laniarius ferrugineus major* (HARTLAUB). — Signalé de Kasindi (LÖNNBERG, p. 24), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 312), de la Semliki (coll. HACKARS) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
 412. — *Laniarius lähdéri* REICHENOW. — Noté de Beni (SASSI, III, p. 26; SCHOUTEDEN, IV, p. 263), des environs de Lutunguru : Bilati, Lepi, Mangwa, de la Kabakuli (coll. J. DE WILDE) et de la Semliki (coll. HACKARS).
 413. — *Dryoscopus gambensis ervini* SASSI. — Noté de Kasindi (SASSI, III, p. 28), de Kalonge et de Lepi/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
 414. — *Dryoscopus senegalensis* (HARTLAUB). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 264; SASSI, III, p. 29; LÖNNBERG, p. 23) et de la Semliki (coll. HACKARS).
 415. — *Dryoscopus angolensis adolphi-friederici* REICHENOW. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 264), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 313), de la Semliki (coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
 416. — *Dryoscopus bocagei jacksoni* SHARPE. — Signalé de Beni (SASSI, III, p. 26) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
 417. — *Tchagra australis emini* (REICHENOW). — Noté de Kasindi (SASSI, III, p. 30), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 262) et de Kalehe/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
 418. — *Tchagra senegala camerunensis* (NEUMANN). — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 121).
 419. — *Tchagra senegala armena* (OBERHOLSER). — Cité de Kasindi (SASSI, III, p. 30).
 420. — *Anitkromus minutus minutus* (HARTLAUB). — Noté de Kasindi (SASSI, III, p. 31) et de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 123; SCHOUTEDEN, IV, p. 262; SASSI, III, p. 31) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
 421. — *Chlorophoneus multicolor batesi* SHARPE. — Noté de la Semliki (coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE), de la Turgula, de la Butahu, des environs de Lutunguru (Kalehe, Kianiamakue, Lepi, Ngerere, Nyabukoko), de la Djelube (coll. J. DE WILDE).
Chlorophoneus melamprosoptus (REICHENOW). — Peut être attendu dans la région.
 422. — *Chlorophoneus sulfureopectus sulphureopectus* (LESSON). — Signalé de Kasindi (SASSI, III, p. 25) et de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 115).
Chlorophoneus rubiginosus rudolfi (HARTERT). — Se rencontre vraisemblablement dans ce secteur.
 423. — *Telophorus quadricolor dohertyi* (ROTHSCHILD). — Signalé de Mangwa/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
Malaconotus lagdeni lagdeni (SHARPE). — N'a pas encore été signalé de la région.

424. — *Malaconotus cruentus adolphi-friederici* REICHENOW. — Cité de Beni (REICHENOW, *Orn. Monatsber.*, XVI, p. 191, 1908), de Beni-Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 265), de la Semliki (coll. J. DE WILDE; coll. HACKARS) et de la forêt entre la rivière Biangolo et Modidi (coll. J. DE WILDE).
425. — *Nicator chloris chloris* (VALENCIENNES). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 120; coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE), de Beni (SASSI, III, p. 30; REICHENOW, II, p. 311; OG.-GRANT, p. 339), de Lesse-Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 262), de la Butahu/Bwanandeke et entre la Biangolo et Modidi (coll. J. DE WILDE).
426. — *Nicator virescens* CABANIS. — Noté de Beni (SASSI, III, p. 30).

Fam. PARIDAE.

427. — *Parus niger purpurascens* VAN SOMEREN. — Noté de Kasindi-Beni (SASSI, III, p. 32), de Beni (REICHENOW, II, p. 354), de Vieux-Radiadia et de l'Irunga (coll. J. DE WILDE).
428. — *Parus funereus* (VERREAUX). — Noté de Beni (SASSI, III, p. 31; OG.-GRANT, p. 334) et de Kalehe/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
429. — *Parus fasciicenter fasciiventer* REICHENOW. — Signalé du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 354).
- Anthascopus roccatii roccatii* SALVADORI. — Peut être attendu dans la région.

Fam. ORIOIIDAE.

430. — *Oriolus oriolus oriolus* (LINNÉ). — Noté de la Luhule/Bombe (coll. J. DE WILDE).
431. — *Oriolus percivali* OG.-GRANT. — Signalé des environs de Lutunguru : Kianlamakue, Kanyabisika et Bilati (coll. J. DE WILDE).
432. — *Oriolus oriolus notatus* PETERS. — Noté de Kasindi (SASSI, II, p. 71), de Mutsora et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
433. — *Oriolus monachii rolleti* SALVADORI. — Signalé de Kasindi-Beni (SASSI, III, p. 72) et de la Luhule/Bugetsi (coll. J. DE WILDE).
434. — *Oriolus monacha laetior* SHARPE. — Signalé de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 21; REICHENOW, II, p. 317; LÖNNBERG, p. 25; SASSI, III, p. 72; OG.-GRANT, p. 268), de Beni-Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 267), de la Semliki, de la Butahu, de la Luhule/Bombe, de la Lusilube et de Mutsora (coll. J. DE WILDE).
435. — *Oriolus nigripennis* VERREAUX. — Noté de Beni (REICHENOW, II, p. 317; SASSI, III, p. 72; SCHOUTEDEN, IV, p. 267) et de la Semliki (coll. HACKARS).

Fam. CORVIDAE.

436. — *Corvus albus* MÜLLER. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 266).
- Corvus albicollis*. — N'a pas encore été officiellement signalé de la région (CHAPIN, I, p. 257).

Fam. STURNIDAE.

437. — *Creatophora carunculata* (GMELIN). — Signalé de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 267).
438. — *Cinnyricinclus leucogaster* (GMELIN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 22; coll. HACKARS; coll. J. DE WILDE), de Beni (OG.-GRANT, p. 263), de la Butahu/Mutwanga, de la Luhule/Bombe et de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).

439. — *Pholia sharpi* (JACKSON). — Noté du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 320) et de la Semliki (coll. J. DE WILDE).
440. — *Lamprocolius splendidus splendidus* (VIEILLOT). — Cité de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 25; SASSI, III, p. 70; SCHOUTEDEN, IV, p. 268; OG.-GRANT, p. 264; LÖNNBERG, p. 25), de la Semliki, de l'Irunga, de la Butahu et de la piste de Katuka entre la Lusilube et la Biangolo (coll. J. DE WILDE).
441. — *Lamprocolius purpureiceps* VERREAUX. — Signalé de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 27; SASSI, III, p. 71; SCHOUTEDEN, IV, p. 268; LÖNNBERG, p. 25), de la Luhule/Bombe, de Bwanandeke, de la piste de Katuka et de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).
442. — *Lamprotornis purpuropterus purpuropterus* RÜPPELL. — Noté de Kasindi (LÖNNBERG, p. 26), de Kasindi-Beni (SASSI, III, p. 69) et de Vieux-Radiadia (coll. J. DE WILDE).
443. — *Onychognathus fulgidus hartlaubii* GRAY. — Cité de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 268; SASSI, III, p. 69).
444. — *Onychognathus walleri elgonensis* (SHARPE). — Signalé de la Kabakuli, de la Modidi, de Bwanandeke, de Nyabukoko/Lutunguru et de Kalisia/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
445. — *Onychognathus tenuirostris* (RÜPPELL). — Signalé du Ruwenzori (SCHOUTEDEN, IV, p. 269), de la Butahu, de Kalonge et de la piste de Katuka (coll. J. DE WILDE).
446. — *Poeyoptera lugubris major* NEUMANN. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 23; coll. J. DE WILDE), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 268), de la Djelube et de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).

Fam. ZOSTEROPIDAE.

447. — *Zosterops virens stuhlmanni* REICHENOW. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 108), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 347; OG.-GRANT, p. 333) et de la forêt de Kamanegu (coll. J. DE WILDE).

Fam. NECTARINIIDAE.

448. — *Nectarinia famosa centralis* VAN SOMEREN. — Signalé de Beni (SASSI, III, p. 33), du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 316) et de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).
449. — *Nectarinia johnstoni dartmouthi* OG.-GRANT. — Signalé du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 353; SCHOUTEDEN, IV, p. 288).
450. — *Nectarinia kilimansis kilimansis* SHELLEY. — Noté de Beni (OG.-GRANT, p. 317; SCHOUTEDEN, IV, p. 288), du Ruwenzori (SCHOUTEDEN, IV, p. 288), de Mutsora et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
451. — *Nectarinia purpureiventris* (REICHENOW, II, p. 353), de Lepi/Lutunguru et de la Djobulo (coll. J. DE WILDE).
- Nectarinia erythroceria erythroceria* HARTLAUB. — N'a pas encore été signalé de ce secteur.
452. — *Cinnyris superbus superbus* (SHAW). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 88) et de Beni (SASSI, p. 34; OG.-GRANT, p. 326; SCHOUTEDEN, IV, p. 287).
453. — *Cinnyris cupreus cupreus* (SHAW). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 286; GYLDENSTOLPE, p. 88; SASSI, III, p. 34).
454. — *Cinnyris venustus igniventris* REICHENOW. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 286) et du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 350).

455. — *Cinnyris reichenowi reichenowi* SHARPE. — Noté de Kianiamakue/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
456. — *Cinnyris chloropygius orphogaster* REICHENOW. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 93), de Beni (OG.-GRANT, p. 323; SCHOUTEDEN, IV, p. 287; REICHENOW, II, p. 350) et de la Djelube (coll. J. DE WILDE).
457. — *Cinnyris minullus marginatus* OG.-GRANT. — Cité de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 92).
458. — *Cinnyris regius regius* REICHENOW. — Signalé du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 332; SCHOUTEDEN, IV, p. 287; REICHENOW, II, p. 351).
459. — *Chalcomitra angolensis angolensis* (LESSON). — Signalé de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 100), de Beni (SASSI, III, p. 37) et de Nyabukoko/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
460. — *Chalcomitra senegalensis aequatorialis* (REICHENOW). — Cité de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 285; REICHENOW, II, p. 349) et de la Semliki (coll. HACKARS).
461. — *Cyanomitra verticalis viridisplendens* (REICHENOW). — Noté de Beni-Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 285) et du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 322).
462. — *Cyanomitra alinae alinae* JACKSON. — Signalé du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 323; REICHENOW, II, p. 348), des environs de Lutunguru : Kalehe, Nyabukoko, Bilati et de Kalonge (coll. J. DE WILDE).
463. — *Cyanomitra cyanolaema* (JARDINE). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 103), de Beni (OG.-GRANT, p. 322; SASSI, III, p. 38), de la Butahu et de la Djelube (coll. J. DE WILDE).
464. — *Cyanomitra olivacea ragazzii* (SALVADORI). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 100), de Beni (OG.-GRANT, p. 321; SASSI, III, p. 37; REICHENOW, II, p. 348) et de Kalisia/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
465. — *Anthreptes collaris hypodilus* (JARDINE). — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 106) et de Beni (SASSI, III, p. 39; OG.-GRANT, p. 320).
466. — *Anthreptes tephrolaema tephrolaema* (JARDINE et FRASER). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 107) et de Beni (SASSI, III, p. 39).
467. — *Anthreptes axillaris* (REICHENOW). — Cité de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 104), de Beni (SASSI, III, p. 38; OG.-GRANT, p. 320) et de la piste de Katuka entre la Lusilube et la Biangolo (coll. J. DE WILDE).
468. — *Anthreptes fraseri cameroonensis* BANNERMAN. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 104).
469. — *Anthreptes seinundi minor* BATES. — Noté de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 108).
470. — *Hylia prasina prasina* (CASSIN). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 153) et de Beni (OG.-GRANT, p. 365; SASSI, II, p. 305).

Fam. PLOCEIDAE.

471. — *Passer griseus ugandae* REICHENOW. — Cité de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 68; coll. HACKARS) et de Beni (SASSI, III, p. 42; SCHOUTEDEN, IV, p. 278; OG.-GRANT, p. 304).
472. — *Phormoplectes insignis insignis* (SHARPE). — Signalé de Kalehe/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
473. — *Phormoplectes dorsomaculatus* (REICHENOW). — Noté de Beni-Mawambi (SASSI, III, p. 60).

474. — *Otyphantes stuhlmanni stuhlmanni* (REICHENOW). — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 270), de Kalehe/Lutunguru (coll. J. DE WILDE) et de Mutsora (coll. HACKARS).
Otyphantes emini budongoensis VAN SOMEREN. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
475. — *Heterhyphantes melanogaster stephanophorus* SHARPE. — Noté de Kianiamakue/Lutunguru et de Nyabukoko/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
476. — *Melanopteryx nigerrimus* (VIEILLOT). — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 33; coll. HACKARS), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 271; SASSI, III, p. 62; REICHENOW, II, p. 323; OG.-GRANT, p. 270), de la Lume et de Mutsora (coll. J. DE WILDE).
477. — *Melanopteryx maxwelli* (ALEXANDER). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 33) et de Beni (SASSI, III, p. 62).
478. — *Cinnamopteryx tricolor interscapularis* REICHENOW. — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 35; coll. J. DE WILDE) et de Beni (SASSI, III, p. 63; SCHOUTEDEN, IV, p. 271).
479. — *Cinnamopteryx aureonucha* SASSI. — Cité de Beni-Mawambi (SASSI, III, p. 63).
480. — *Sitagra capitalis dimidiatus* (ANTINORI ET SALVADORI). — Signalé de Beni (REICHENOW, II, p. 325; OG.-GRANT, p. 275) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
481. — *Sitagra cucullatus femina* (OG.-GRANT). — Cité de la rive Nord du lac Édouard (REICHENOW, II, p. 324), de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 31) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 271).
482. — *Pachyphantes superciliosus superciliosus* (SHELLEY). — Noté de Beni (REICHENOW, II, p. 326; SASSI, III, p. 66; OG.-GRANT, p. 279), signalé de la Bombe (coll. J. DE WILDE).
483. — *Hyphanturgus brachypterus crocatus* (HARTLAUB). — Cité de la vallée de la Semliki (SCHOUTEDEN, IV, p. 271), de Beni (OG.-GRANT, p. 280) et de Mutsora (coll. J. DE WILDE).
484. — *Hyphanturgus nigricollis nigricollis* (VIEILLOT). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 42) et de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 271; SASSI, III, p. 61; OG.-GRANT, p. 274).
485. — *Hyphanturgus alienus* (SHARPE). — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 272), forêt de Kambatule et Kalonge (coll. J. DE WILDE).
486. — *Xanthophilus xanthops camburni* (SHARPE). — Noté de Kasindi (SASSI, III, p. 66).
487. — *Xanthophilus aurantius rex* NEUMANN. — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 43) et de Beni (SASSI, III, p. 61).
488. — *Malimbus malimbicus crassirostris* HARTERT. — Cité de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 38; coll. HACKARS), de Beni (LÖNNBERG, p. 26; SCHOUTEDEN, IV, p. 269; REICHENOW, II, p. 320; SASSI, III, p. 55; OG.-GRANT, p. 270), de Bwanandeke, de la Butahu, de la Biangolo et de la piste de Katuka (coll. J. DE WILDE).
489. — *Malimbus rubricollis centralis* REICHENOW. — Rencontré dans la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 37; coll. HACKARS) et à Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 269; SASSI, III, p. 55).
490. — *Malimbus nitens microrhynchus* REICHENOW. — Signalé de Beni (SASSI, III, p. 54; LÖNNBERG, p. 26) et de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).
491. — *Malimbus coronatus* SHARPE. — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 39) et de Beni (SASSI, III, p. 57).

492. — *Malimbus erythrogaster fagani* OG.-GRANT. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 39; coll. J. DE WILDE; coll. HACKARS) et de Beni (LÖNNBERG, p. 25; OG.-GRANT, p. 270; SASSI, III, p. 57).
493. — *Amblyospiza albifrons melanota* (HEUGLIN). — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 27; coll. HACKARS), de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 272; REICHENOW, II, p. 327; SASSI, II, p. 66; OG.-GRANT, p. 282; LÖNNBERG, p. 27), de la forêt de Kambatule (coll. J. DE WILDE), de la Djonulo et de la Luhule (coll. J. DE WILDE).
494. — *Quelea quelea centralis* VAN SOMEREN. — Signalé de Beni (OG.-GRANT, p. 283; SASSI, III, p. 48) et de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 273).
495. — *Euplectes gierowii ansorgei* (HARTERT). — Signalé de Beni (OG.-GRANT, p. 284) et de la Luhule/Bombe (coll. J. DE WILDE).
496. — *Euplectes capensis crassirostris* (OG.-GRANT). — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 287).
497. — *Urobrachya axillaris phoenicea* (HEUGLIN). — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 49), de Beni (OG.-GRANT, p. 288; SCHOUTEDEN, IV, p. 274) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
498. — *Coliuspasser albonotatus eques* (HARTLAUB). — Noté de Kasindi (SCHOUTEDEN, I, p. 163).
499. — *Coliuspasser ardens* (BODDAERT). — Signalé de Kasindi (SASSI, III, p. 45), de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 49; SCHOUTEDEN, IV, p. 274) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
500. — *Spermestes cuculatus cuculatus* SWAINSON. — Noté de Beni (SASSI, III, p. 49; GYLDENSTOLPE, p. 50; SCHOUTEDEN, IV, p. 275).
501. — *Spermestes bicolor mentalis* HARTLAUB. — Signalé de la forêt de Nganzi (coll. J. DE WILDE).
Amauresthes fringilloides (LAFRESNAYE). — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
502. — *Nigrita canicapilla canicapilla* (STRICKLAND). — Signalé de Beni (SASSI, III, p. 47; GYLDENSTOLPE, p. 52; SCHOUTEDEN, IV, p. 276; OG.-GRANT, p. 294), de la Semliki (coll. HACKARS), de la Butahu, de la Lume, de la Luhule et de Kaléhe/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
503. — *Nigrita lutefrons lutefrons* VERREAUX. — Noté de Beni (SASSI, III, p. 47).
504. — *Nigrita bicolor saturator* REICHENOW. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 53) et de Beni-Mawambi (SASSI, III, p. 47).
505. — *Nigrita fusconotus fusconotus* FRASER. — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 54) et de Beni (SASSI, III, p. 48).
506. — *Spermophaga ruficapilla ruficapilla* (SHELLEY). — Noté de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 55), de Beni (SASSI, III, p. 68), de Lesse (SCHOUTEDEN, IV, p. 273), du Ruwenzori (REICHENOW, II, p. 327) et de la Butahu (coll. J. DE WILDE).
507. — *Spermophaga poliohenys* (OG.-GRANT). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 54) et de Beni (OG.-GRANT, p. 283; SASSI, III, p. 67).
Cryptospiza reichenowi ocularis SHARPE. — Peut être attendu dans ce secteur.
Cryptospiza jacksoni SHARPE. — Se rencontre vraisemblablement dans la région.
508. — *Cryptospiza salvadorii ruwenzori* W. SCLATER. — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 297).
Cryptospiza shelleyi SHARPE. — N'a pas encore été signalé de la région.
509. — *Pirenestes ostrinus rothschildi* NEUMANN. — Signalé de Beni-Mawambi (SASSI, III, p. 48).

510. — *Ortygospiza atricollis dorsostrata* VAN SOMEREN. — Noté de Kasindi (SASSI, III, p. 50).
511. — *Madingoa nitidula schlegeli* (SHARPE). — Signalé de la vallée de la Semliki (GYLDENSTOLPE, p. 57).
512. — *Lagonosticta senegala ruberrima* REICHENOW. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 277; REICHENOW, II, p. 335; SASSI, III, p. 51).
Coccopygia melanotis nyanzae (NEUMANN). — Peut se rencontrer dans la région.
513. — *Estrilda astrild nyanzae* NEUMANN. — Signalé de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 276; GYLDENSTOLPE, p. 60).
514. — *Estrilda rhodopyga centralis* KOTHE. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 276).
515. — *Sporaeginthus subflava subflava* (VIEILLOR). — Cité du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 301).
516. — *Sporaeginthus paludicola paludicola* HEUGLIN. — Signalé de Beni (OG.-GRANT, p. 299).
517. — *Sporaeginthus nonnula nonnula* HARTLAUB. — Lepi/Lutunguru (coll. J. DE WILDE).
Nesocharis ansorgei (HARTERT). — Peut être attendu dans ce secteur.
518. — *Vidua macroura* (PALLAS). — Signalé de Beni (GYLDENSTOLPE, p. 67; SCHOUTEDEN, IV, p. 277).

Fam. FRINGILLIDAE.

519. — *Polioptila striolata graueri* (HARTERT). — Cité de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 278), du Ruwenzori (OG.-GRANT, p. 305) et de Kalonge (coll. J. DE WILDE).
520. — *Polioptila burtoni tanzanicae* (GRANVIE). — Signalé de Kalonge et de la forêt de Kamanegu (coll. J. DE WILDE).
521. — *Spinus citrinelloides frontalis* REICHENOW. — Noté de Beni (SCHOUTEDEN, IV, p. 279; OG.-GRANT, p. 308) et de Kalonge (coll. J. DE WILDE).
522. — *Serinus sulphuratus shelleyi* NEUMANN. — Noté de la Semliki (coll. HACKARS).

Fam. EMBERIZIDAE.

- Emberiza flaviventris flaviventris* STEPHENS. — Peut être attendu dans la région.